

## **POSTUP PRO APLIKACI**

Vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech

### **ŘEDĚNÍ VAKCÍNY:**

1. Dezinfikovat ruce, rukavice se nepoužívají.
2. Dezinfikovat gumovou zátku fyziologického roztoku.
3. Dezinfikovat gumovou zátku lahvičky s vakcínou.
4. Nasadit silnější jehlu (zelená, žlutá, černá) na 2 ml stříkačku.
5. Natáhnout 1, 8 ml fyziologického roztoku a vstříknout do lahvičky s vakcínou, jemně promíchat.
6. Vizuálně zkontrolovat vzhled roztoku (průhledný bez krystalů). Takto připravený roztok je možno použít při pokojové teplotě po dobu 6 hodin.
7. Sejmout stříkačku a na jehlu, která zůstává v lahvičce postupně nasazovat 1 ml stříkačky.
8. Do každé 1ml stříkačky natáhnout 0, 3 ml připraveného roztoku a hned nasadit modrou jehlu, ponechat krytku na jehle. Odložit na táč.
9. Zopakovat minimálně 5x. Pokud je to možné i 6x. Tím máme připravené jednotlivé dávky z původní lahvičky.

### **APLIKACE VAKCÍNY:** / Dezinfikovat ruce, není nezbytně nutné používat rukavice. /

10. Dezinfikovat místo vpichu (přednostně nedominantní paže).  
Počkat po dobu 1 min do zaschnutí.
11. Aplikovat i.m. hluboko do svalu (m. deltoideus).
12. Po vyjmutí jehly dezinfikovat místo vpichu a přelepit náplastí.
13. Stisknout místo vpichu, aby nedošlo ke krvácení.
14. Ponechat očkovaného po dobu 30 minut v čekárně.